

カンキツグリーンング病 持込み診断のご案内

沖縄県ではカンキツグリーンング病まん延防止のため、持込み診断を実施しています（無料）。

カンキツグリーンング病とは？

世界的に重要なかんきつの病害。**感染すると数年後に枯れる。**

病気の広まり方：ミカンキジラミが媒介、病気の木からの取り木・接ぎ木

病気の治療方法：**なし**。感染源となる病気の木は速やかに伐採処分する。

ミカンキジラミ

成虫

2~3mm



幼虫

1~2mm



感染



枯死



カンキツグリーンング病の症状

下の図のように、木の一部の枝が枯れたり、右の図のような特徴のある葉が見られます。

枝枯れ



主脈の黄化



まだら退緑



脈間黄化



黄化

サンプルの採集方法

- ・検査したい木1本につき、4方向から症状のある葉(5枚程度)を含む枝を1本ずつ計4本採取し、まとめて袋にいれる。
- ・検査したい木が複数本ある場合は、どの木から採集したか判別できるようにする。(例: No.1、No.2 ...と番号をつける等)




※葉は切り離さずに枝ごと4本入れる



ゴマダラカミキリの被害

ゴマダラカミキリによる被害もカンキツグリーンング病と同様の症状を引き起こします。サンプル採取の際は、下記のような被害がないかも確認してください。



樹皮の食害痕



成虫の脱出孔

カミキリムシ対策

- ①脱出孔に専用殺虫剤をまいた後、肥料等をまき、樹勢を高める。
- ②4月までに株元から高さ60cmまで、ネット等を巻く(産卵防止)

持込み診断の依頼やお問い合わせは下記にお願いします。

* 市町村役場農林水産担当課 (各市町村の問い合わせ先を記入してください)

* 病害虫防除技術センター本所: 098-886-3880 宮古: 0980-73-2634 八重山: 0980-82-4933

カンキツグリーンング病 持込み診断のご案内

沖縄県ではカンキツグリーンング病まん延防止のため、持込み診断を実施しています（無料）。

カンキツグリーンング病の症状

世界的に重要なかんきつの病害。**感染すると数年後に枯れる。**

病気の広まり方：ミカンキジラミという虫、病気の木からの取り木・接ぎ木

病気の治療方法：**なし**。感染源となる病気の木は速やかに伐採処分する。

カンキツグリーンング病とは？

下の写真のような葉が見られたり、一部の枝が枯れる。

枝枯れ



主脈の黄化 まだら退緑

脈間黄化

黄化

サンプルの採集方法

- ・ 検査したい木 1 本につき、4 方向から症状のある葉(5 枚程度)を含む枝を 1 本ずつ計 4 本採取し、まとめて袋にいれる。
- ・ 検査したい木が複数本ある場合は、どの木から採集したか判別できるようにする。
(例：No.1、No.2 ...と番号をつける等)



東西南北より 4 枝採



※葉は切り離さずに枝ごと 4 本入れる



持込み診断の依頼やお問い合わせは下記にお願いします。

* 市町村役場農林水産担当課（各市町村の問い合わせ先を記入してください）

* 病害虫防除技術センター 本所：098-886-3880 宮古：0980-73-2634 八重山：0980-82-4933

カンキツグリーニング病 持込み診断のご案内

沖縄県ではカンキツグリーニング病まん延防止のため、持込み診断を実施しています（無料）。

カンキツグリーニング病とは？

世界的に重要なかんきつの病害。**感染すると数年後に枯れる。**

病気の広まり方：ミカンキジラミという虫、病気の木からの取り木・接ぎ木

病気の治療方法：**ない**。病気の木は感染源となるので速やかに伐採処分する。



主脈の黄化



まだら退緑



脈間黄化



黄化



枝枯れ

サンプルの採集方法

樹の4方向から上図のような症状のある葉を含む枝を1本ずつ、計4本採集し、1つの袋にいれる。

持込み診断の依頼やお問い合わせは下記にお願いします。

* 市町村役場農林水産担当課（各市町村の問い合わせ先を記入してください）

* 病害虫防除技術センター 本所: 098-886-3880 宮古: 0980-73-2634 八重山: 0980-82-4933