



種 別	対 象 年 齢	0歳	3ヵ月	6ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳		
ヒブ	生後2月から 1歳の誕生日前日まで	1~3回		※接種開始年齢・接種状況によって回数は異なる														
	追加：1歳から5歳の誕生日 前日まで			1回														
小児用 肺炎球菌	生後2月から 2歳の誕生日前日まで	1~3回		※接種開始年齢・接種状況によって回数は異なる														
	追加：1歳から5歳の誕生日 前日まで			1回														
B型肝炎	1歳の誕生日前日まで	3回																
BCG (結核)	1歳の誕生日前日まで	1回																
DPT-IPV等 (ジフテリア 百日咳 ポリオ 破傷風)	生後3月から90月 (7歳半)	4回																
MR (麻しん・風疹)	1期：1歳から2歳の 誕生日前日まで			1回														
	2期：小学校就学前の1年間 (年度末3/31まで)					1回												
水痘	1歳から 3歳の誕生日前日まで			2回														
おたふく かぜ	1歳から 2歳の誕生日前日まで			1回														
日本脳炎	1期： 生後6月から90月(7歳半)	3回																
	2期：9歳から13歳の誕生日 前日まで														1回			
	※平成7年4月2日～平成19年4月1日 生まれの方は、20歳未満の間受ける ことができます。	1期の通知は高校1・2年生に、2期の通知は高校3年生にお送りします。																
D T	11歳から13歳の誕生日前日まで														1回			

★対象年齢以外は全額自己負担になりますので、受け忘れないようご注意ください！

★転出した場合は転出先の市町村にお問い合わせ下さい。(スケジュールや料金等に若干違いがある場合があります)

★子供は発熱などで体調が変わりやすいので、通知がきたら調子のいいとき早めに受けましょう♪

★受けるときは、予診票と親子(母子)手帳を必ず持参しましょう。

### 【 接 種 間 隔 】

ワクチンの種類によって次の予防接種までの間隔が違います。注意しましょう。



#### 生ワクチン

MR・BCG・おたふくかぜ・水痘

27日以上あけて



#### 不活化ワクチン

ポリオ・DPT・4種混合・DT・B型肝炎  
日本脳炎・インフルエンザ・肺炎球菌・ヒブ

6日以上あけて

次の予防接種



★同じ種類のワクチンを接種するときはそれぞれの決められた間隔を守りましょう。

(例えば…ヒブなら4週間)

★下記の疾患にかかったときは、体調が回復するのを待って接種しましょう。

麻しん(はしか)	風疹・水痘・おたふく	インフルエンザ・手足口病・突発性発疹等ウイルス性疾患
治ってから4週間 程度あけて接種	治ってから2~4週間 程度あけて接種	治ってから1~2週間程度あけて接種